



Vleesconsumptie

Het eten van 1 kg rundvlees stoot net zoveel broeikasgassen uit als 100 km autorijden! Gaat dit ook op voor andere soorten vlees? Wat is het verschil tussen kippen- en rundvlees?



De vleesproductie zorgt wereldwijd voor 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen (FAO, 2006). Het is verantwoordelijk voor ongeveer 9% van de CO₂-uitstoot, 37% van de methaan-uitstoot (CH₄) en 65% van de lachgas-uitstoot (N₂O) wereldwijd. Alhoewel CH₄ en N₂O in kleinere hoeveelheden aanwezig zijn, zijn ze respectievelijk 25 keer en 298 keer schadelijker dan CO₂ over een periode van honderd jaar.

Wat kan u doen?

U kan uw vleesconsumptie verminderen. Het produceren van rundvlees zorgt voor 13 keer meer broeikasgassen dan kippenvlees en 4 keer meer dan varkensvlees!

Dit verschil tussen kippen- en rundvlees wordt hoofdzakelijk verklaard doordat:

- Een koe meer voedsel nodig heeft dan een kip. Bij de productie van veevoeder worden meststoffen, die ook moeten aangemaakt worden, en machines, die benzine nodig hebben, gebruikt; en
- Enkel herkauwers (waaronder koeien) CH₄ bij de vertering uitstoten.

De verschillende stappen van de kippen- en rundvleesproductie, evenals de bijhorende uitstoot van broeikasgassen vindt u in de bijlage.

In de wereld

In ontwikkelde landen eet een persoon gemiddeld 64 kg vlees per jaar, in ontwikkelingslanden is dit slechts 24 kg..

Wist u dat?

Herkauwers (vee, schapen,...) hebben 4 magen. In de eerste maag maken bacteriën de vertering van het gras mogelijk door fermentatie. Hierbij komt 400 tot 600 liter CH₄ per dag vrij.

